



La medicina que puede comprar sin receta se llama medicamento sin prescripción o medicamento OTC (del inglés over-the-counter).

Las etiquetas tienen toda la información que necesita para elegir medicamentos correctamente y usarlos de forma segura.

Este es un ejemplo de una medicina OTC. Cuenta con “información del medicamento”.

Drug Facts	
Active ingredient (in each tablet)	Purpose
Chlorpheniramine maleate 2 mg.....	Antihistamine
Uses temporarily relieves these symptoms due to hay fever or other upper respiratory allergies: ■ sneezing ■ runny nose ■ itchy, watery eyes ■ itchy throat	
Warnings	
Ask a doctor before use if you have	
■ glaucoma ■ a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis	
■ trouble urinating due to an enlarged prostate gland	
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking tranquilizers or sedatives	
When using this product	
■ drowsiness may occur ■ avoid alcoholic drinks	
■ alcohol, sedatives, and tranquilizers may increase drowsiness	
■ be careful when driving a motor vehicle or operating machinery	
■ excitability may occur, especially in children	
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.	
Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.	
Directions	
adults and children 12 years and over	take 2 tablets every 4 to 6 hours; not more than 12 tablets in 24 hours
children 6 years to under 12 years	take 1 tablet every 4 to 6 hours; not more than 6 tablets in 24 hours
children under 6 years	ask a doctor

El “Ingrediente activo” es el nombre científico del medicamento, También muestra la cantidad. Cada tableta tiene 2 miligramos del ingrediente activo.

Drug Facts	
Active Ingredient (in each tablet)	Purpose
Chlorpheniramine Maleate 2 mg	Antihistamine

“Usos” indica los síntomas o problemas que el medicamento cura. Este cura los síntomas de alergias, como estornudos y goteo en la nariz.

Uses temporarily relieves these symptoms due to allergies	□ sneezing	□ runny nose
------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

“Advertencias” indica quien **no debe usar** esta medicina. Si tiene glaucoma o enfisema, debe preguntar a su doctor antes de usarlo.

Warnings	
Ask a doctor before use is you have	
□ glaucoma	□ a breathing problem such as emphysema

“Advertencias” le dice lo que debe y no debe hacer cuando toma esta medicina. Si toma esta medicina, debe tener cuidado cuando maneja un vehículo motorizado.

Warnings When using this product <input type="checkbox"/> be careful when driving a motor vehicle or operating machinery <input type="checkbox"/> drowsiness may occur

“Advertencias” también indica posibles efectos secundarios. Esta medicina puede hacerlo sentir mareado.

“Direcciones” explica cómo usar este medicamento. Los adultos y niños mayores de 12 años pueden tomar 2 tabletas cada 4 a 6 horas. Los niños entre 6 y 12 años sólo deben tomar 1 tableta. Hable con un doctor antes de darle esta medicina a un niño menor de 6 años.

Directions	
Adults and children 12 and over	take 2 tablets every 4 to 6 hours not more than 12 tablets in 24 hours
Children 6 years to under 12 years	take 1 tablets every 4 to 6 hours not more than 6 tablets in 24 hours
Children under 6 years	ask a doctor

Nunca tome más medicamentos de lo que recomiendan las direcciones.

Muchos medicamentos se venden en contenedores que tienen tapas de seguridad. La medicina puede ser peligrosa para los niños. Recuerde guardar todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños.



La mejor forma de cuidar de sí mismo al usar cualquier medicamento, es leer la etiqueta. Si hay cualquier cosa que no comprende, pregunte al farmacéuta.

Para más información acerca de las etiquetas de prescripciones, vea **Etiquetas de Prescripciones.**

Para más información acerca de las etiquetas de advertencia, vea **Etiquetas de Advertencia.**

Para más información acerca de los efectos secundarios, vea **Efectos Secundarios.**